



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
HELLENIC SOCIETY OF
INTERNAL MEDICINE

Μαϊνδρού 23, 115 28 Αθήνα
23 Meandrou Str. | P.O. 115 28 Athens, Greece
T. +30 210 7245421 | F. +30 210 7245616
e-mail: info@hsintmed.gr, hsintmedicine@gmail.com
www.hsintmed.gr

Με τη συνεργασία της
Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος

Επιστημονική Εκδήλωση
**"Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
στην Παθολογία:**

Τεκμηριωμένες απαντήσεις σε
ερωτήματα της καθημερινής κλινικής
πράξης"

Καβάλα
Ξενοδοχείο
"LUCY"
21 - 23/06
2019

**ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ**

Θα χορηγηθούν 14 Μόρια
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
από τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: **CONGRESS WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**

Οργάνωση Συνεδρίων

Μιχαλακοπούλου 27, 11528 ΑΘΗΝΑ | Τηλ. 210 72 10001, 210 72 10052, 210 72 10025, Φαξ. 210 72 10051

www.congressworld.gr, email: reception@congressworld.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόεδρος:	Νικόλαος Τεντολούρης
Αντιπρόεδρος:	Λεωνίδας Λαναράς
Γενικός Γραμματέας:	Ανδρέας Μεθιδώνης
Ειδικός Γραμματέας:	Κωνσταντίνος Μακρυλάκης
Ταμίας:	Μιχαήλ Σαμάρκος
Μέλη:	Γεώργιος Δημητριάδης
	Ηλίας Μυγδάλης
	Μαρία Μυλωνά
	Σπυρίδων Ντουράκης

Οργανωτική Επιτροπή

Γ. Δημητριάδης
Λ. Λαναράς
Κ. Μακρυλάκης
Α. Μεθιδώνης
Η. Μυγδάλης
Μ. Μυλωνά
Σ. Ντουράκης
Μ. Σαμάρκος
Ν. Τεντολούρης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

18:00	ΕΓΓΡΑΦΕΣ
18:30	ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
19:00-19:30	ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Π. Παπαδοπούλου Διερεύνηση αναιμίας Β. Περιφάνης
19:30-20:00	ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Φ. Παπουλίδου Υπερτασική κρίση Ν. Καμπουρίδης
20:00-20:30	ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Ν. Παπουλίδης Η διάγνωση και η προγνωστική αξία της τροπονίνης και των νεότερων καρδιακών βιοδεικτών - Καρδιολόγος Δ. Μακρυγιάννης
20:30- 21:00	ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Ν. Τεντολούρης Περιφερική αρτηριακή νόσος – Διάγνωση και αντιμετώπιση Δ. Καραγιαννίδης Σχολιασμός: Α. Μελιδώνης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 22 Ιουνίου 2019

-
- 09:30-10:00 ΔΙΑΛΕΞΗ**
Προεδρείο: **Η. Μυγδάλης**
Οστεοπόρωση
Ν. Τουραμανίδης
Σχολιασμός: **Ε. Τσαρίδης**
-
- 10:00-12:00 HOW TO TREAT**
Θεραπευτικές παρεμβάσεις
Προεδρείο: **Ξ. Κροκίδης, Α. Μελιδώνης**
Διαβητικός ασθενής 62 ετών με A1C 8,4% υπό εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας
Σ. Πατπαντωνίου
Ασθενής 55 ετών που εμφανίζει αιμορραγία πεπτικού 3 μήνες μετά από ΟΣΣ και τοποθέτηση DES
Β. Καμπερίδης
Στεφανιαίος ασθενής 75 ετών με υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό
Ν. Αγγελόπουλος
Ασθενής με Σακχαρώδη Διαβήτη και Νεφροπάθεια
Κ. Μακρυλάκης
-
- 12:00-12:30 Διάλειμμα**
-
- 12:30-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**
Φλεβική θρόμβωση
Προεδρείο: **Ξ. Κροκίδης, Μ. Τιμοσίδης**
Πρόληψη-διάγνωση-αντιμετώπιση
Γ. Βουλαλάς
Πνευμονική Εμβολή – πρόληψη – διάγνωση – αντιμετώπιση
Χ. Χατζηελευθερίου
-
- 13:30-14:00 ΔΙΑΛΕΞΗ**
Προεδρείο: **Χ. Λούπα**
Έλεγχος για καρδιοαγγειακή νόσο σε ασυμπτωματικά άτομα
Κ. Μακρυλάκης
-
- 14:00-16:30 Ελαφρύ Γεύμα – Μεσημβρινή Διακοπή**
-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-
- 16:30-17:00 ΔΙΑΛΕΞΗ**
Προεδρείο: **Α. Χατζητόλιος**
Διακοπή καπνίσματος
Π. Κατσαούνου
Σχολιασμός: **Ν. Κατσίκη**
-
- 17:00-17:30 ΔΙΑΛΕΞΗ**
Προεδρείο: **Γ. Τζατζάγου**
Προσπέλαση ασθενούς με αρθραλγία-αρθρίτιδα
Χ. Παπαγόρας
-
- 17:30-18:30 ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ**
Προεδρείο: **Χ. Μανές, Ν. Τεντολούρης**
Εισηγητές: **Π. Παναγόπουλος, Ε. Ιωαννίδου**
-
- 18:30-19:00 Διάλειμμα**
-
- 19:00-19:30 ΔΙΑΛΕΞΗ**
Προεδρείο: **Ν. Παπάνας**
Νεότερα αντιμικροβιακά
Π. Παναγόπουλος
-
- 19:30-20:30 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ**
Προεδρείο: **Σ. Παπαντωνίου, Η. Μυγδάλης**
Εξελίζεις στην αντιυπερτασική θεραπεία
Μ. Σωτηρόπουλος
Εξελίζεις στην αντιδιαβητική αγωγή
Β. Λεκάκης
Στατίνες σε ασθενείς με ηπατική νόσο
Ν. Κατσίκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2019

-
- 09:30-11:00** **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**
Σύγχρονη διάγνωση και θεραπεία συνήθων ηπατικών παθήσεων
Προεδρείο: **Σ. Ντουράκης**
Ηπατίτιδα Β & ηπατίτιδα Δ
Σ. Στυλιανίδης
Ο δρόμος για την εξάλειψη της Ηπατίτιδας C
Γ. Τσιολακίδου
Μη αλκοολική λίπωση του ήπατος
Σ. Ντουράκης
-
- 11:00-11:30** **ΔΙΑΛΕΞΗ**
Προεδρείο: **Β. Λεκάκης**
Σύγχρονη αντιμετώπιση λοιμώξεων ΚΝΣ από την Κοινότητα
Η. Χυτάς
-
- 11:30-12:00** **ΔΙΑΛΕΞΗ**
Προεδρείο: **Β. Ιωαννίδης**
ΧΑΠ- τι πρέπει να γνωρίζει ο Παθολόγος
Γ. Πατλάκας
-
- 12:00-12:30** **ΔΙΑΛΕΞΗ**
Προεδρείο: **Δ. Παπάζογλου, Μ. Μυλωνά**
Τι πρέπει να γνωρίζω για τη βιταμίνη D
Κ. Κώτσα
-
- 12:30-14:30** **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**
Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια. Βασικές αρχές και σύγχρονη αντιμετώπιση
Προεδρείο: **Γ. Δημητριάδης, Α. Ράπτης**
Εισαγωγικά στοιχεία. Από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι και το τμήμα επειγόντων περιστατικών
Ξ. Κροκίδης
Αντιμετώπιση του ασθενούς κατά την οξεία νοσοκομειακή φάση
Κ. Βαδικόλιας
Δευτερογενής πρόληψη εγκεφαλικών κατά τη χρόνια φάση
Α. Ξάνθης
-
- 14:30-15:00** **Συμπεράσματα-Λήξη Δημερίδας**

ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Αγγελόπουλος Ν.	Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, PhD
Βαδικόλιας Κ.	Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Νευρολογική Κλινική, Παν/μιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Βουλαλάς Γ.	Αγγειοχειρουργός, Επικ. Επιμελητής, ΓΝ Καβάλας
Δημητριάδης Γ.	Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β΄ Προπ. Παθολογικής Κλινικής - Μονάδας Έρευνας - & Διαβητολογικού Κέντρου, Παν/μιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας
Ιωαννίδης Β.	Συντονιστής Διευθυντής Α΄ Πνευμονολογικής Κλινικής, ΓΝ Καβάλας
Ιωαννίδου Ε.	Παθολόγος, Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Ρεθύμνου
Καμπερίδης Β.	MD, MSc, PhD, FESC, Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Παν/μιακό ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
Καμπουρίδης Ν.	Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝ Καβάλας
Καραγιαννίδης Δ.	Αγγειοχειρουργός
Κατσαούνου Π.	Επ. Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ομάδας Διακοπής Καπνίσματος & Ιατρικής Εκπαίδευσης της ERS
Κατσίκη Ν.	Ειδική Παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Ιατρείο Παχυσαρκίας – Λιπιδίων, Τμήμα Ενδοκρινολογίας – Μεταβολισμού, Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Παν/μιακό ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ», Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκληρώσεως
Κροκίδης Ξ.	Παθολόγος, Δρ Πανεπιστημίου MAINZ Γερμανίας, Διευθυντής ΓΝ Καβάλας
Κώτσα Κ.	Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας – Διαβητολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Ενδοκρινολογίας – Διαβήτη & Μεταβολισμού, Α΄ Παθολογική Κλινική – Διαβητολογικό Κέντρο, Παν/μιακό ΓΝ «ΑΧΕΠΑ»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Λεκάκης Β.	Παθολόγος Δράμα, Επιστημονικός Συνεργάτης, Β΄ Προπ. Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Λούπα Χ.	Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη - Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού «Δ. Βογιατζόγλου», ΓΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»
Μακρυγιάννης Δ.	Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝ Καβάλας
Μακρυλάκης Κ.	Αν. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α΄ Προπ. Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
Μανές Χ.	Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, τ. Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Μελιδώνης Α.	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής - Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
Μυγδάλης Η.	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Β΄ Παθολογικής Κλινικής και Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝΑ ΝΙΜΤΣ
Μυλωνά Μ.	Παθολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Α΄ Παν/μιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
Ντουράκης Σ.	Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β΄ Παν/μιακής Παθολογικής Κλινικής & Ομώνυμου Εργαστηρίου ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Ξάνθης Α.	Παθολόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ
Παναγόπουλος Π.	Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Β΄ Παν/μιακή Παθολογική Κλινική, Παν/μιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Παπαγόρας Χ.	Επ. Καθηγητής Ρευματολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Παπαδοπούλου Π.	Παθολόγος, Διευθύντρια Α΄ Παθολογικής Κλινικής, ΓΝ Καβάλας
Παπάζογλου Δ.	Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΔΠΘ, Διαβητολογικό Κέντρο Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΔΠΘ, Παν/μιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Παπάνας Ν.	Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη, Ιατρικό Τμήμα ΔΠΘ, Διαβητολογικό Κέντρο, Β΄ Παθολογική Κλινική Παν/μιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης


ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Παπαντωνίου Σ.	Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη και την Ηπατολογία, Υπεύθυνος Διαβητολογικού - Ηπατολογικού & Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, ΓΝ Καβάλας
Παπουλίδης Ν.	Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝ Καβάλας
Παπουλίδου Φ.	Νεφρολόγος, Διευθύντρια Μονάδας ΣΦΠΚ, Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ Καβάλας
Πατλάκας Γ.	Συντονιστής Διευθυντής Πνευμονολογίας, ΓΝ Κομοτηνής
Περιφάνης Β.	Επ. Καθηγητής Αιματολογίας, ΑΠΘ, Α΄ Προπ. Παθολογική Κλινική, Παν/μιακό ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
Ράπτης Α.	Αν. Καθηγητής Παθολογίας – Διαβητολογίας, Β΄ Προπ. Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας – Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Παν/μιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Στυλιανίδης Σ.	Γαστρεντερολόγος, Επ. Επιμελητής Β΄, ΓΝ Καβάλας
Σωτηρόπουλος Μ.	Παθολόγος
Τεντολούρης Ν.	Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α΄ Προπ. Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία Παν/μίου Αθηνών, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας
Τζατζάγου Γ.	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Αν. Συντονίστρια Διευθύντρια Α΄ Παθολογικής Κλινικής - Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Τιμοσίδης Μ	Παθολόγος – Διαβητολόγος, τ. Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογικής Κλινικής, ΓΝ Καβάλας
Τουραμανίδης Ν.	Χειρουργός Ορθοπαιδικός
Τσαρίδης Ε.	Ορθοπαιδικός
Τσιολακίδου Γ.	Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α΄, ΓΝ Καβάλας
Χατζηελευθερίου Χ.	Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝ Δράμας
Χατζητόλιος Α.	Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής Α΄ Προπ. Παθολογικής Κλινικής, Παν/μιακό ΓΝ ΑΧΕΠΑ, Α΄ Αντιπρόεδρος Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος, Αντιπρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος
Χυτάς Η.	Ειδικός Παθολόγος- Εντατικολόγος, Επιμελητής Α΄, Β΄ Παθολογική Κλινική, ΓΝ Καβάλας



ORIZAL PLUS[®]

Olmesartan Medoxomil, Amlodipine Besilate, Hydrochlorothiazide



ORIZAL[®]

Olmesartan Medoxomil, Amlodipine Besilate



Περατέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Αν. Δαμβέργη 7, 104 45 Αθήνα, Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, info@menarini.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.)
ευχαριστεί για την υποστήριξη και τη συμβολή τους
στην επιτυχία της Επιστημονικής Εκδήλωσης τους κάτωθι:





Eliquis[®] apixaban

PP-ELI-GRC-0037-OCT16



PFIZER HELLAS A.E. Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: Επιστημονικής Ενημέρωσης: 210 67.85.800, Παραγγελιών: 210 81.99.060

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας

Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7245421, Fax: 210 7245616

E-mail: info@hsintmed.gr , hsintmedicine@gmail.com

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Ξενοδοχείο LUCY, Καβάλα

Διεύθυνση: Ακτή Καλαμίτσας, 65404 Καβάλα

Τηλ.: 2510600060

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εγγραφή είναι ΔΩΡΕΑΝ και περιλαμβάνει:

- ο Την παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
- ο Προσφορά Καφέ και ελαφρού γεύματος στη Μεσημβρινή Διακοπή
- ο Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης στη λήξη

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η Επιστημονική Εκδήλωση έχει μοριοδοτηθεί με 14 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

CONGRESS WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 27, 11528 Αθήνα,

Τηλ. 210 72 10001, 210 72 10052

www.congressworld.gr, E-mail: reception@congressworld.gr

Το Trulicity κάνει ΤΟ ΚΛΙΚ στον ασθενή σας



Ισχυρή μείωση
της HbA_{1c}¹



Χορηγείται μία φορά
την εβδομάδα¹



Εύχρηστη πένα^{1,2}

1. Π.Χ.Π. Trulicity
2. Οδηγίες Χρήσης Trulicity

trulicity
dulaglutide once-weekly injection

41 TrULAD 9_2018

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Trulicity 0,75 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη πένα Trulicity 1,5 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη πένα. **ΠΟΙΟΤΗΤΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Trulicity 0,75 mg ενέσιμο διάλυμα: Κάθε προγεμισμένη πένα περιέχει 0,75 mg νουλιγλουτίνης σε 0,5 ml διαλύματος. Trulicity 1,5 mg ενέσιμο διάλυμα: Κάθε προγεμισμένη πένα περιέχει 1,5 mg νουλιγλουτίνης σε 0,5 ml διαλύματος. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ** Ενέσιμο διάλυμα (βενή). **Διαγής:** άρτυρο βέλος με **θεραπευτικές ενδείξεις** Το Trulicity ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου ως Μονοθεραπεία. Όταν η διατροφή και η άσκηση μόνο δεν μπορούν επαρκώς γλυκαιμικό έλεγχο σε ασθενείς για τους οποίους η χρήση μεταφορικών θεωρείται ανεπαρκής λόγω δυσανεξίας ή απενδύσεων. **Συμπεριλαμβανόμενη θεραπεία** Σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που προκαλούν μείωση των επιπέδων γλυκόζης, συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης, όταν αυτά, σε συνδυασμό με διατροφή και άσκηση, δεν παύουν επαρκώς γλυκαιμικό έλεγχο. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** **Δοσολογία:** Μονοθεραπεία Η συνιστάμενη δόση είναι 0,75 mg μία φορά την εβδομάδα. **Συμπεριλαμβανόμενη θεραπεία:** Η συνιστάμενη δόση είναι 1,5 mg μία φορά την εβδομάδα. Για βιολογικά ευαίσθητους ηλικιωμένους, όπως ασθενείς ηλικίας > 75 ετών, μπορεί να εξεταστεί δόση 0,75 mg μία φορά την εβδομάδα ως ρυθμιζόμενη δόση. **Τρόπος χορήγησης:** Το Trulicity θα πρέπει να χορηγείται με ένεση υποδόρια στην κοιλιακή χώρα, το μηρό ή τον ώμο. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση** Η νουλιγλουτίνη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή για τη θεραπεία της διαβητικής ketoacidosis. Η χρήση σκευασμάτων υποδόσιας του GLP-1 μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών του γαστρεντερικού συστήματος. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη θεραπεία ασθενών με νεφρική δυσλειτουργία. Η νουλιγλουτίνη δεν θα μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή νόσο του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής γαστρίτιδας και εντερικής με συστολής σε αυτούς τους ασθενείς. **Θέση παγκρεατίτιδας:** Η χρήση σκευασμάτων υποδόσιας του GLP-1 έχει associat με κίνδυνο ανάπτυξης οξείας παγκρεατίτιδας. Εάν υπάρχει υποψία παγκρεατίτιδας, η χορήγηση της νουλιγλουτίνης θα πρέπει να διακοπεί. **Υπεργλυκαιμία:** Οι ασθενείς που λαμβάνουν νουλιγλουτίνη σε συνδυασμό με σουλφονυλουρία ή ινσουλίνη μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Οι κίνδυνοι υπογλυκαιμίας μπορεί να μειωθεί με τη μείωση της δόσης της σουλφονυλουρίας ή της ινσουλίνης. **Παράγοντες που δεν είναι μελετηθεί** Υπόκεινται περιορισμένη εμπειρία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. **Παρασκευάσματα σε νεύρο:** Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση 1,5 mg, δηλ. ουσιαστικά είναι «ελεύθερο νατρίου». **Επιδράσεις στην κενότητα οδηγίας και καριέρα μηχανήματος:** Το Trulicity δεν έχει καμία ή ελάχιστη επίδραση στην κενότητα οδηγίας ή καριέρα μηχανήματος. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με σουλφονυλουρία ή ινσουλίνη, θα πρέπει να συζητείται στους ασθενείς να λαμβάνουν προφυλάξεις για την αποφυγή εμφάνισης υπογλυκαιμίας κατά την οδηγία και τον καριέρα μηχανήματος. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ταυτοποιηθεί με βάση την αξιολόγηση των κλινικών μελετών φάσης II και φάσης III σε σχέση με τη διαφορά τους. **Πολύ Σπάνια:** ≥ 1/10. **Διαταραχές του μεταβολισμού και της βλάβης:** Υπογλυκαιμία (όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ινσουλίνη, γλυμεπρίλη, μεταφορμίνη ή μεταφορμίνη και γλυμεπρίλη). **Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος:** Ναυτία, διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος. **Σπάνια:** ≥ 1/100. **Διαταραχές του μεταβολισμού και της βλάβης:** Υπογλυκαιμία (όταν χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία ή με μεταφορμίνη και γλυμεπρίλη). **Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος:** Μετεωρισμός, ναυτία, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός, κοιλιακή διαστολή, γαστροοισοφαγική παλινδρομηση, οξείες γαστρικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης. **Κόπωση:** Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης. **Παραρτηριακές εξετάσεις:** Φθισοαδενική ταχυκαρδία, κοιλιακοί ακούσιες πρώτου βαθμού (AVB) **Οι σπάνια:** ≥ 1/10.000 έως < 1/10.000. **Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:** Ανάσχεση από θέση της ένεσης. **Διαταραχές του νευρικού συστήματος:** Περικαρδιακή. **Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων:** Χοληλιθίαση, χολοκυστίτιδα. **Σπάνια:** ≥ 1/10.000 έως < 1/10.000. **Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος:** Οξεία παγκρεατίτιδα. **Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος:** Αναπνευστική ανεπάρκεια. **Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού:** Αλλεργιοδερμία. **Μη γνωστές:** Δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα δεδομένα δεδομένα. **Διαταραχές του γαστρεντερικού:** Μη γνωστές. **Μη γνωστές:** Δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα δεδομένα δεδομένα. **Επιδράσεις στην σπινική παρακολούθηση της αντίθεσης ορώσεως:** κίνδυνο του φαρμακευτικού προϊόντος, λήψη από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς Εθνικής Οργάνωσης Φαρμάκων, Μεσογίων 284, GR-15562 Χαλκίδας Αθήνα, Τηλ. +30 21 3204330/337, Fax +30 21 0456955. **Ιστοσελίδα:** <http://www.eef.gr>. **Ιστοσελίδα προφυλάξεις κατά τη χρήση του προϊόντος:** Να διατηρείται στο ψυγείο (2°C - 8°C). Να μην καταψύσσεται. Να διατηρείται στην αρχική συσκευασία του, προκειμένου να προστατευτεί από το φως. **Τελική:** Το Trulicity μπορεί να διατηρείται εντός ψυγείου για έως και 14 ημέρες σε θερμοκρασία που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 30°C. **Βιολογικές προφυλάξεις απόδοσης και άλλες καριέρες:** Κάθε προγεμισμένη πένα αποτελεί προϊόν η οποία με πρόταση απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους εκάστοτε κανόνες διαχείρισης. **Οδηγίες χρήσης:** Η προγεμισμένη πένα είναι για μία χρήση μόνο. **Οι οδηγίες:** χρήση της πέννας ή οποιεσδήποτε περιλαμβανόμενα στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Θα πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά. Το Trulicity δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν υπάρχουν ορατά σωματίδια ή εάν το διάλυμα είναι θολό ή/και απορρυπατισμένο. Το Trulicity δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν διαπιστωθεί. **ΚΑΤΩΤΕ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΙΞΗΣ:** ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΣ: Lilly Nederland B.V., Papestepleinweg 63, 3528 EU Utrecht, Ολλανδία. **ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΕΙΞΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/17/456/001. **TRULICITY INJ. SOL. 0,75MG/0,5ML:** B162 PF-PEN. EU/17/456/006. **TRULICITY INJ. SOL. 1,5MG/0,5ML:** B162 PF-PEN. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΘΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΙΞΗΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2014. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** Ιούλιος 2018. **Διαταγή:** πληρωθείσα ποσότητα για το πέντε φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu>. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:** 90% για ασθενείς με **ΔΙΔ.** **ΜΟΡΦΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** TRULICITY INJ. SOL. 0,75MG B162 PF-PEN. XT-46.41E, AT.63.95E, NT.40.38E. TRULICITY INJ. SOL. 1,5MG B162 PF-PEN. XT-46.55E, AT-64.15E, NT-40.50E. Για την πλήρη Π.Χ.Π. και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν απευθυνθείτε στην εταιρεία ή και στο www.trulicity.gr.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και: Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα. Συμπληρώστε την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

150 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά **ΤΗΛ:** 210 6294600 **Fax:** 210 6294610

Για παραγγελίες: **ΤΗΛ:** 210 6294629 **Fax:** 210 6294630 **e-mail:** orders@lilly.gr **www.pharmaserve.gr**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, text, or other markings on the page.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
HELLENIC SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE

Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα 23 | Meandrou St. 115 28 Athens, Greece | Tel. +30 210 7245421 | Fax: +30 210 7245616



www.hsintmed.gr

info@hsintmed.gr, hsintmedicine@gmail.com